


FISICOQUIMICA UNQ – Comisión C

Seminario 0 – Conocimientos previos necesarios

Química

- Enuncie la ley de Coulomb.
- ¿Qué es una molécula polar? ¿Qué características debe presentar?
- ¿En qué tipo de propiedades de una sustancia se reflejan las interacciones intermoleculares?
- El siguiente gráfico representa de manera esquemática cómo varía el potencial de interacción entre dos moléculas. Identifique en dicho gráfico la región en la que predominan las fuerzas atractivas, la región en la que predominan las fuerzas repulsivas y el radio de van der Waals.



- ¿Por qué el hielo es menos denso que el agua líquida? ¿Es ésta una regla general para cualquier sustancia?
- ¿En cuáles de los siguientes procesos es necesario romper enlaces covalentes y en cuáles simplemente se vencen fuerzas intermoleculares?
 - Hervir agua.
 - Descomposición del N_2O_4 en NO_2 .
 - Sublimación de hielo seco.
 - Fusión de un trozo de hielo.
 - Disociación de F_2 en átomos de F.
- ¿En qué se diferencian una transformación física de una transformación química? Mencione ejemplos.
- Se tienen 0,5 moles de dióxido de carbono (CO_2). Calcular:
 - La masa en gramos de esos 0.5 moles.
 - El número de moléculas presentes.
 - El número de átomos de carbono que hay en esa masa de óxido.
- ¿Cuántos átomos de carbono hay en un mol de glucosa (fórmula molecular: $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$)? ¿Y en 360 gramos?
- Calcule la masa molar de un compuesto si 0,372 moles de éste tienen una masa de 152 g.
- Una muestra de un compuesto contiene 0,40 g de hidrógeno y 6,40 g de oxígeno. ¿Cuál es su fórmula empírica?
- Determine la fórmula molecular de los compuestos para los cuales corresponden las siguientes fórmulas empíricas y pesos (masas) moleculares:
 P_2O_5 PM: 283,88
 CO_2H PM: 90

- m. Enuncie, explique y grafique las leyes que describen el comportamiento de los gases ideales en las siguientes transformaciones a n constante:
- I. variaciones de P y V a T constante.
 - II. variaciones de T y V a P constante.
 - III. variaciones de P y T a V constante.
- n. Calcule el peso molecular de un gas si 0,608 g ocupan un volumen de 750 mL a 385 mm de Hg y 35 °C (asumir comportamiento ideal).
- o. ¿Las interacciones no covalentes de atracción aumentan o disminuyen cuando un gas contenido en un recipiente experimenta los siguientes cambios?
- I. Se disminuye la temperatura manteniendo el volumen y la cantidad de gas constantes.
 - II. Se inyecta más gas al recipiente a temperatura y volumen constantes.
 - III. Se expande manteniendo la temperatura y la cantidad de gas constantes.

Matemática

- a. La temperatura T , en grados centígrados, que adquiere una pieza sometida a un proceso viene dada en función del tiempo t , en horas, por la expresión:

$$T(t) = 40t - 10t^2 \text{ con } 0 \leq t \leq 4$$

- I. Represente gráficamente la función T y determine la temperatura máxima que alcanza la pieza.
 - II. ¿Qué temperatura tendrá la pieza transcurrida 1 hora? ¿Volverá a tener esa misma temperatura en algún otro instante?
- b. Halle los valores de a y b para que la función $f(x) = x^3 + ax^2 + b$ tenga un extremo relativo en el punto $(-2,3)$. Halle la ecuación de la recta tangente a la curva $y = x^3 - 4x + 2$ en su punto de inflexión.
- c. Determinar las condiciones más económicas de una piscina abierta al aire, de volumen 32m^3 con un fondo cuadrado, de manera que la superficie de sus paredes y del suelo necesite la cantidad mínima de material.
- d. Contestar, razonando la respuesta, si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones:

a) $\int_a^b f(x)dx + \int_b^c f(x)dx = \int_a^c f(x)dx$

b) $\int_a^b f(x)g(x)dx = \int_a^b f(x)dx \int_a^b g(x)dx$

c) Si $\int_a^b f(x)dx = 0$, entonces $a = b$

d) Si $\int_a^b f(x)dx = 0$ y $f(x) > 0$ para todo x , entonces $a = b$

e) $\int_a^b (f(x) + g(x))dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$

- e. La concentración de ozono contaminante, en microgramos por metro cúbico, en una ciudad viene dada por la función

$$C(x) = 90 + 15x - 0,6x^2$$

donde x es el tiempo transcurrido desde 1 de enero de 1990 contado en años.

- I. ¿Hasta qué año estará creciendo la concentración de ozono?
 - II. ¿Cuál es la concentración máxima de ozono que se alcanza en esa ciudad?
- f. Sabemos que la función $f(x) = ax^2 + bx$ tiene un máximo en el punto $(3,8)$.
- I. Halle los valores de "a" y "b".
 - II. Para dichos valores, calcule la ecuación de la recta tangente a $f(x)$ en el punto de abscisa 0.
- g. Grafique y calcule las primitivas de las siguientes funciones para $x > 0$.

$$f(x) = e^x \quad f(x) = e^{-x} \quad f(x) = \frac{1}{x} \quad f(x) = \ln x$$

- h. Calcule la primitiva de

$$f(x) = \frac{1}{x-a} \quad f(x) = \frac{1}{(x-a)^2} \quad f(x) = \frac{1}{(x-a)(x-b)}$$